幼幼新書

幼幼新書卷第二十　熱蒸汗疸　凡九門

後學古吳陳履端于始輯
長洲吳安民允懷校

虛熱第一

錢乙論脣深紅治法散肺虛熱少服瀉白散喘嗽上氣門

論虛實熱證朱監簿子五歲發熱頤赤脣紅煩躁引飲醫謂心熱用牛黄丸三服一物瀉心湯下之來日反加無力不食又下之利黄沫錢曰心經虛勞病用白朮散生胃中津胃氣不和門次生犀散夫大便黄沫者

此虛熱也胃氣正瀉自止朱曰瀉心湯何如錢曰黃連性寒多服則痢能寒脾胃衆醫曰實熱錢曰若實熱何瀉心湯下之不安反加面黃頰赤五心煩躁不食引飲而大便黃沫者服瀉心湯多故也以胡黃連丸治愈（病後虛羸門）

養生治風勞氣冷百疾薯蕷丸并治風眩背拘脅滿短氣羸瘦食少兒泄痢多汗發熱

薯蕷（三兩）　當歸　桂（去皮）　熟地黃

大豆黃卷（炒）　神曲（各一兩）　乾薑（三錢）　白歛（二錢）

甘草(炙二兩八錢)　人參　阿膠(炒各七錢)　芎

白芍藥　白术　麥門冬(焙)　杏仁(麸炒)

防風(各六錢)　柴胡　白茯苓　桔梗(各半兩)

細末蜜丸彈子大濃煎棗湯空心日午各嚼一丸

有熱人丸桐子大米飲下二三十丸

錢乙補心安神丸治面黃頰赤壯熱

麥門冬(焙)　馬牙硝　白茯苓　乾山藥

寒水石　甘草(各半兩)　朱砂(一兩)　龍腦(一字)

末蜜丸芡實大砂糖水化半丸無時

生犀散治目淡紅心虛熱

生犀（二錢）　地骨皮　赤芍藥　柴胡根

乾葛（各一兩）　甘草（半兩炙）

粗末一二錢水一鍾煎七分食後温服

地骨皮散治虛熱潮作亦治傷寒壯熱及餘熱

地骨皮　知母　銀柴胡　甘草（炙）

半夏（湯洗七次焙）　人參（焙）　赤茯苓

等分細末二錢薑五片水一盞煎八分食後温服

莊氏人參犀角散治榮衛不和上焦虛熱因積變肌

熱不已變瘖勞夜汗頰赤多嗽

人參　茯苓　白术各半两　犀角

柴胡　鼈甲醋炙　半夏薑製　甘草炙各一分

末半錢水半盞薑棗煎三分食後温服

治體虛發熱不思飲食或多驚悸壯氣補虛黄耆丸

黄耆蜜炒黄　人參　柴胡　乾薯蕷

赤茯苓各半两　黄芩小紫者　生犀各一分

細剉焙燥擣末蜜丸如櫻桃麥門冬湯磨服

孔氏治心虛有熱恍惚不常言語錯亂尸疰客忤魘

夢不祥兒驚癇桃奴丸

桃梟七枚不成實冬留枝上　桃仁十四枚　安息香無灰酒飛銀器中慢火熬膏　生玳瑁各一兩　琥珀　雄黃煮研　辰砂飛各三分　黑犀磨澄各半兩　牛黃

腦麝各一分

細末和入膏丸如雞頭瓷器封置淨室食後人參湯嚼一丸未知加

骨熱第二骨熱初病剩骨蒸病

聖惠兒十歲內勿着新綿冬天勿用火烘衣着勿食

桃杏傷寒後未百日勿食羊狗肉俱令體熱或作骨蒸

水鑑治骨熱勞漸瘦弱不食神明丸聖惠無蟾酥名光明砂丸

鼓子花　雄黃　紫石英　遠志各二分

檳榔一枚　桃仁　光明砂各一分　金箔一片

研細蟾酥丸如麻子米飲下一丸忌果子

博濟犀角散治骨熱晩多發熱面赤五心煩四肢無力食減盜汗面痿黃

犀角　柴胡　枳殼麩炒　麥門冬

茯苓　芍藥　大黄　桑白皮

黄耆　人參各一分　鼈甲一枚九肋者醋炙

細末半錢桃仁七個漿水煮麥門冬十九個去心同研水一盞煎六分溫服早食後臨卧各一服亦治大人盜汗

聖惠胡黄連散治骨熱瘦瘁心神煩躁不卧

胡黄連　知母　地骨皮　黄芩

梔子　川升麻　犀角　甘草炙

杏仁麩炒各一分　柴胡　鼈甲醋炙各半兩

粗散一錢水一盞煎五分不時量温服

治骨蒸黄瘦不食多卧胡蜣蜋散

胡蜣蜋（兩枚炒净） 人參 大黄（微炒） 赤茯苓

赤芍藥 紫菀 甘草（炙） 枳殼（麩炒）

蚍黄 牛黄（各一分） 柴胡（半兩） 熊膽

蟇（燒灰各半分） 麝（一錢） 鼈甲（醋炙一分）

末温水調半錢日三服量加減

骨熱體瘦心神煩躁天靈蓋散（張渙多秦艽甘草名連艽丸）

天灵蓋（一枚酥炙） 黄連（半兩）

細散粥飲調半錢日三四量服
胡黃連丸治骨熱煩躁黃瘦飲食無味
胡黃連　人參　羚羊角　地骨皮
黃耆　木香　犀角　甘草炙
萎蕤各一分　柴胡　麥門冬焙　秦艽
鱉甲醋炙各半两
羅末蜜丸如菉豆湯下七丸日三更量
骨熱羸瘦食不生肉獺肝丸
獺肝微炙　人參　龍膽　黃芩

黃連 白朮 枳殼麩炒 鼈甲醋炙各半兩 麥門冬焙一兩 柴胡三分 桃仁麩炒廿枚

羅末蜜丸如菉豆湯下七丸日三更量

胡黃連丸

胡黃連 乾蟾酒浸去骨炙各三分 麝一分

羅末蜜丸如菉豆粥飲下五丸日三四更量兒

萬全胡黃連丸治骨熱煩躁黃瘦飲食無味

胡黃連 人參 羚羊角 地骨皮

黃耆 犀角 木香 甘草炙

萎蕤各一分　鼈甲醋炙　麥門冬焙　柴胡

秦艽各半兩

羅末蜜丸如菉豆服七丸溫水下日三更量

張氏治骨熱體瘦面痿黃臍腹時痛胷膈滿悶不食

常服退黃長肌進食解虛勞行滯氣利關節猪肚丸莊氏多青蒿

南木香半兩　宣黃連　生地黃　青橘皮

銀柴胡　鼈甲童便炙各二兩

細末猪肚一個盛藥緊繫慢火煮擣極爛丸如麻

子服二三十丸，溫米飲下，日二三，食前後皆可。

吳氏生犀飲　治兒十歲內肌體煩燥，或食桃杏酸熱類，或傷寒後肌熱羸瘦，或食羊肉令兒體熱，或作骨蒸瘦瘁，潮熱煩赤，口乾，五心煩躁，食不生肌，盜汗，伏臥食泥，一切蒸熱。

羚羊角　地骨皮　紫菀　麥門冬（焙）

秦艽　大黃（生）　枳殼（麩炒）　柴胡

茯苓　赤芍藥　人參　桑白皮

黃耆　羌活　半夏麯（炙黃）　鱉甲（醋炙，再炒）

醋炙焦各一分

散一錢水一盞煎五分食後夜卧温服兒五歲内服半錢

鄭愈殺蟲去骨熱進食駐顏蝦蟆丸

紫斑蝦蟆一枚去腸爪薑製炙　蘆薈　鶴虱

宣連各二錢　胡黄連一錢

末獖猪膽汁丸菉豆大服三丸飯飲下日三可少加麝

骨蒸第三

骨熱骨蒸雖有淺深治宜通用

楊大鄴兒日漸黄瘦皮膚不潤因胎氣虚損筋骨羸弱由強行交會或成娠事出偶然或母有宿疾久冷血海氣衰羸瘦胎内已自虧損及生自然尫悴由父母遺氣若非巧治終為沉痾或少乳多哺咀嚼之物腸胃轉轉乾慄兒少者號腑乾長成者為骨蒸

醫局生犀散治骨蒸肌瘦頰赤口乾日晡潮熱盗汗五心煩躁四肢困倦食不生肌及大病差後餘毒不觧或傷寒後食羊肉體熱不除

羚羊角　地骨皮　秦艽　麥門冬

枳殼(麸炒)　大黄(蒸焙)　柴胡　茯苓

赤芍藥　桑白皮　黄耆　人參

鼈甲(醋炙)

等分粗末二錢水一盞青蒿少許煎六分食後温服兒小减

聚寶治骨蒸熱久去三焦壅滯虚熱不思飲食大小並宜國老散

甘草(炙)　銀柴胡　秦艽　大烏梅(肉焙乾各二兩)

末食後熱湯點服忌炙煿

張氏地黃散治骨蒸體熱勞倦

熟地黃　當歸　地骨皮　枳殼麸炒

柴胡　秦艽　知母　鼈甲醋炙

等分末錢半水一盞烏梅半個煎七分和梅熱服

莊氏治骨蒸及一切痨煮雞丸

黃脚雌雞一隻淨　柴胡　黃連各四兩

粗末夾生絹袋盛雞腹中縫煮極爛漉出骨和藥

焙乾擣末酒麪糊丸如菉豆不時湯服廿丸量加

治骨蒸潮熱羸瘦生肌消疳黃胡黃連丸

胡黃連　黃連　柴胡各一兩　烏犀

赤茯苓　史君子　黃芩細緊者　鼈甲炙各半兩

細末猪膽麪糊丸如菉豆服一二十丸湯下

治骨蒸熱黃瘦虛汗欬嗽心忪日久不已朱砂柴胡丸

朱砂飛一兩　柴胡二兩

細末豶猪膽汁和濕入磁合炊飯甑上蒸至飯熟出急丸如小豆空心臨卧桃仁烏梅湯冷下十丸

唐崔和悌灸二十二種骨蒸法夫含靈受氣稟于五行攝生乖理降以六疾骨蒸病者亦名傳屍名殗殜名伏連名無辜丈夫以癖氣為根婦人以血氣為本少長多染此疾嬰孺傳注更苦其狀髮乾而聳或聚或分或腹中有塊或腦後小結多至五六或夜卧盜汗兒交雖目視分明而四肢無力上氣食少漸就沉羸縱延日時終于溘盡予嘗三十日灸活一十三人前後差者二百至于狸骨獺肝金牙銅鼻罕見其能未若此扶危拯急非止單攻骨蒸又別療氣療風或

痺或勞或邪或癖等患

取穴法

令患人平身正立取細繩（蠟之勿令展縮）順脚底貼肉堅踏之（男左女右）繩前頭與大拇指端齊當脚跟中心向後引繩循脚肚貼肉直上至曲脷中大横紋截斷又令患人解髮平分兩邊自顖門至腦後見頭縫平身正坐取向所截繩一頭與鼻端齊引繩正循頭縫至腦後貼肉垂下循脊骨至繩盡處當脊骨以墨點記（墨點不是灸處）又取一繩令患人合口將繩按口上兩頭至吻却

鈎起繩中心至鼻柱根下如△字便齊兩吻斷將此繩展令直于前量脊骨上墨點處橫量取平勿令高下先中摺繩繩中以墨記展繩開橫量以繩上墨點正壓脊墨點于繩兩頭以白圈記白圈是灸穴

以上第一次點二穴

令其人平身正坐稍縮臂膊取繩繞項向前雙垂與鳩尾齊心岐骨也無此骨者至心胷前兩岐骨下量取一寸即雙截斷却背翻繩頭向項後以繩中停取心正當喉嚨結骨上其繩兩頭夾項雙垂循脊骨以墨點記墨點不是灸處又取一繩

令其人合口橫量齊兩吻截斷還于脊骨上墨點橫
量如法繩兩頭白圈記白圈是灸處
以上第二次點穴通前共四穴同時灸日別各七
壯至二七壯累灸至百五十壯為妙候瘡欲差又
依後法灸二穴
以第二次量口吻繩于第二次雙繩頭盡處墨點上
當脊骨直上下直點令繩中停中心在墨點上于上
下繩盡頭以白圈記兩穴白圈是灸處
以上第三次點二穴謂之四花灸兩穴各百壯三

次共六穴各取離日量度度訖即下火須三月三日艾最佳疾差百日內慎飲食房室安心靜處將息一月後覺未差復初穴上再灸

上六穴名六花

點穴圖

自大栂指端當脚跟向後至曲䏚大横紋當中

自鼻端向上量循頭縫至腦後灸腦門禁穴

循脊骨引繩頭向下至繩盡處當脊骨以墨點之

合口以繩按口上鈎起繩中心至鼻柱下便齊两吻截斷

將量口吻繩展直于前来脊骨上墨點處横量两頭以白圈記

白圈灸穴

已上第一次點二穴

取一繩繞項向前雙垂與鳩尾齊

飜繩頭向項後以繩两頭夾項雙垂循脊骨向下至两繩頭盡處以墨點記

令人合口以繩横量齊两吻截斷

用量口吻繩于脊骨墨點上横量两頭以白圈記白圈是灸穴

以第二次量口吻繩
于第二次雙繩頭盡
處墨點上直上下直
量繩盡頭用白圈記
以上是第二次點二穴

此係已點成四花

骨蒸候有二十二種並依前圖灸

一胞蒸　小便赤黄

二玉房蒸　男遺尿失精女月漏不調

三腦蒸　頭眩熱悶

四髓蒸　覺髓沸熱

五骨蒸　齒黑

六筋蒸　甲熱

七血蒸　髮赤

八脉蒸　急緩不調

九肝蒸　或時眼前昏暗

十心蒸　舌焦或瘡或時胷滿

十一脾蒸　唇焦熱或口瘡

十二肺蒸　口乾生瘡

十三腎蒸　耳乾焦

十四膀胱蒸　右耳焦

十五膽蒸　眼目失光

十六胃蒸　舌下痛

十七小腸蒸　下瀝不禁

十八大腸蒸　右鼻孔痛

十九三焦蒸　乍寒乍熱

二十肉蒸　別人覺熱自覺冷

廿一皮蒸　皮肉生雞肉起

廿二氣蒸　遍身壯熱不自安息

用尺寸取穴法

凡穴孔尺寸皆隨人身大小須男左女右量手指中一節兩横紋中為一寸兒亦以此為準

艾炷大小法

凡艾炷須足三分若不足恐覆孔穴不備穴中經脉火氣不行即不能抽邪氣引正氣

採艾法

端午日日未出于艾中以意求其似人者拮之灸殊有效艾未有真似人者明暗間以意命之

用火法

黄帝曰松柏柹桑棗榆柳竹等木之火用灸必害肌肉勿用宜敲石取火或水晶鏡子于日得太陽火天陰以槐木取火

灸後宜服治勞地黃丸

生地黃　青蒿　薄荷(並汁)　童便

好酒(各二升煎成膏)　柴胡　鼈甲(醋炙)　秦艽(各一兩)

朱砂　麝(各半兩)

爲末入前膏和丸如桐子服十五至二十丸溫酒下忌生冷物

盜汗第四

巢氏盜汗者眠睡而汗自出也兒陰陽之氣嫩弱腠理易開若將養過溫因于睡卧陰陽氣交津液發泄

為汗
養生兒肌瘦有汗用平和養氣血溫藥自無虞(木桂地黃芎歸等)
錢乙論盜汗者肌肉虛也主止汗散(喜汗門)遍身汗主
香瓜丸汗出上至項下至臍此胃虛也主補胃益黃
散(胃氣不和門)
論治病有等張氏三子歲大者遍身汗(盜汗)次者汗上
至項下至臍(胃虛)小者但額有汗(喜汗)衆以麥煎散治不
效錢曰大者香瓜丸次者益黃散小者石膏湯各五

日愈

寶鑑兒心膈發熱時痢盜汗者多病痟

王訣盜汗虛熱歌

盜汗頻頻氣受傷臟中虛熱小便黃夜間發熱
無時節煩赤脣乾口有瘡

先退熱次調氣後和臟府

形證論歌

頻頻生盜汗虛熱小便黃夜臥時煩熱嗚牙腎
受傷氣粗還氣細肝內要消詳

因傷氣兆風蘊熱乃三焦不通暢出汗久則成驚南星丸先利三焦（傷寒變疹門）次下大青丹（急慢驚門）得心氣不驚恐汗不止先服防風湯一二服補氣定汗

千金三物黃連粉

黃連　牡蠣　貝母（各十八銖）

粉一升合擣篩粉身

犀角飲由心藏熱盜汗體熱瘦瘁多驚

犀角（十八銖）　茯神（一兩）　麥門冬（一兩半）　甘草（炙半兩）

白朮（炮錢六）

㕮咀水九合煎四合分四服加龍齒一兩佳

外臺

麻黃根　雷丸　牡蠣熬各三兩　甘草炙二兩

乾薑一兩　粱米一升

擣粉粉身汗即止

聖惠犀角散治盜汗體熱咽乾

犀角　茯神　麥門冬焙　黃耆

人參各半兩　甘草炙一分

粗羅一錢水小盞煎五分不時溫服量分減

黄耆湯治體熱盜汗心煩不食

黄耆　朱砂(研各半兩)　龍腦(一錢)　人參

升麻　大黄(炒)　甘草(炙)　天竺黄

牡蠣(各一分)

細羅不時竹葉湯調半錢量加減

錢乙香瓜丸

大黄瓜(黄色者一枚)　胡黄連　大黄(濕紙裹煨)

柴胡　鼈甲(醋炙)　黄蘗　黄連

蘆薈　青橘皮

等分黃瓜割去頭填藥末蓋口杖子插定慢火內煨熟麪糊丸如菉豆食後冷漿水下三二丸或新水大者五七至十丸

治虛熱盜汗黃耆散

牡蠣　生地焙　黃耆

等分末煎服無時

張渙沉香鼈甲丹治潮熱盜汗

鼈甲童便浸酥炙　黃耆　草龍膽　當歸

沉香各一兩　大黃炮　川黃連各半兩

細羅蜜丸黍大麥門冬湯下十粒量加減

治血少肌瘦盜汗茯苓丹

肉蓯蓉酒浸去皺皮炙　鼈甲酥炙各一兩　黃耆

何首烏　當歸各半兩

羅煉蜜丸如黍溫米飲下十丸食前量加減

牡蠣散專止盜汗

牡蠣二兩　麻黃根　赤石脂　糯米各一兩

龍腦一錢

末新綿包日夜撲有汗處

張氏白龍散

龍骨半兩　麝少許

研細服半錢冷水調

莊氏治肌熱盜汗不思飲食柴胡飲

柴胡　青蒿　嫩桃柳枝各陰乾

甘草炙　地骨皮

等分細剉二錢入烏梅一個小麥四十九粒水一盞煎七分食後臨卧温服

吉氏治胃熱盜汗及衣厚傷温汗出麻黄散

麻黃根（焙一分）　樊皮（半兩炒黃黑色）

細末半錢至一錢猪耳煎湯調

喜汗第五

巢氏兒有血氣未實者膚腠踈若厚衣温卧藏府生熱蒸發腠理津液泄越故頭身喜汗

錢乙六陽虛汗上至頭下至項不過胷不須治

寶鑑汗出喜驚舌上白者衣厚傷熱

王訣兒血熱若病夜間有汗皆因抱得胷堂熱傳與脾脾傳氣氣傳血血家既熱內被淳陽氣抱却升即

化為汗髮者血之餘血為根髮為苗血家既熱頭髮作穗血家既熱渾身黃瘦血家既熱夜間汗出不為盜汗宜涼胃散

形證論心之液為汗兒緣驚心氣不收故多汗宜歛心氣

寶鑑厚衣傷溫歌

衣厚傷溫損小兒熱蒸津液透皮膚致令身體并頭上汗出如珠滴濕衣

外臺犀角飲心藏熱故有汗

犀角三分　茯神四分　麥門冬六分　甘草炙二分

白朮一分

切，水九合，煎四合，分再服。加龍齒四分良。

錢乙方

故蒲扇燒灰，温酒調一二錢。如無，故蒲亦可。

玉訣治多汗涼胃散

青黛　馬牙硝　大黄蒸，各半兩　甘草炙，一分

末，蛤粉水下半字。

勞氣第六

東方先生法夫勞疾諸證應男婦小兒得患未須察脉看指甲美惡知何勞候病熱甚者脚甲甲青黑者傳尸證紅白正色候黃白者酒色候紅紫者氣勞候或欬嗽或涎壅咽中或骨蒸汗出或泄利或吐紅或驚魘或婦人不調之類先服去虫藥後服治病湯劑

化虫丸

大檳榔　麝當門子各一枚　麝半錢

青蒿心三錢

粗末羊肝一片劉入藥為餡白麪半兩和餅作餃

子二個煿熟男患冷水浸左手腕三寸右手取藥吃陳米飲下緩緩食青皁被覆虫隨汗出急去之

側柏散補女浸右腕

側柏散

側柏　五靈脂

等分熱湯浸二錢不時温呷

奪命救生散治大小傳尸肺瘻骨蒸酒色食氣諸勞

桑白皮　白茯苓　杏仁　枳殼

人參　桃仁　陳皮焙　秦艽淨

白芷各一兩　麻黄去節　柴胡各半兩　甘草炙
附子炮　桂心生　檳榔各半兩　肉豆蔻三个
當歸洗焙二兩　麝三錢
末鼉魚大者二斤湯諜去淡血頭腸肚入藥麻皮
縛紙裹數重塩泥紙筋固濟約厚六七寸許就地
掘坑可容糠三籮先以糠半安坑底入泥毬再以
糠半鋪滿四傍撥火一伏時取出將藥幷肉骨三
處焙乾一處杵末溫酒服二錢不勝酒水一盞桃
柳枝各三寸烏梅半個煎七分不時服量加減

保中丸服此十指生毛如藕■可治紫黑難治或依古法四花穴灸（骨蒸門）

天靈蓋 鼈甲（醋浸一宿羊脂炙黃） 虎頭骨（酒拌炒各一兩） 赤梗青蒿子 人參 桃仁（麩炒） 知母 甘草（生各半兩）

細末阿魏二錢同桃仁研和諸藥蜜丸桐子大烏梅湯下三十丸不時兒作小丸

治嗽喘涎盛吐紅氣息漸乏金蓮散

白礬（枯二錢） 故㯶櫚 新綿（各一兩） 男亂髮（三錢）

三味烧灰入礬研麝香湯調一錢

外臺狐狸吃力迦丸療老少傳尸骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐痢時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘀血月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤中人吐乳

吃力迦（白术） 光明砂 當門子 訶梨勒皮

香附（瓦上磨取中白） 沉香 青木香 丁香

安息香 白檀香 蓽撥（上者） 犀角（各一兩）

薰陸香 蘇合香 龍腦香（各半兩）

篩極細蜜和丸井花水服梧子大四丸老小一丸

蠟紙裹彈子大一丸緋帒盛懸當心一切邪鬼不敢近千金不傳冷水煖水臨時斟量臘月合有神藏密器中勿泄氣秘之忌生血物桃李雀肉青魚鮓等

熱渴第七

巢氏兒血氣甚則府藏生熱熱則藏燥故渴

小方脉論兒吃水太多腹脹後瀉蓋水不歸小腸却入大腸大腸受穀不受水小腸受水不受穀此病皆惜抱損之故心與小腸合心熱小腸亦熱熱氣上行

奔胃口致孩子喫水水奔小腸被小腸氣熱滲泄不
及轉入大腸先下淋藥次凉心藏後止渴

經驗方

大牡蠣日端午日黃泥裹煅為末活鯽魚湯下
一錢七兒半錢

聖惠治心肺積熱渴不止咽喉乾痛黃連散

黃連　射干　升麻　赤茯苓
麥門冬　玄參　甘草炙　桑白皮
黃芩各半兩

羅散一錢水小盞青竹葉七片煎五分去滓入蜜半合更煎一二沸溫時時呷

麥門冬散治心脈熱壅悶煩渴不止

麥門冬焙　梔子仁　犀角　知母

甘草炙　黃芩等分

羅散一錢水小盞竹葉七片煎五分不時量服

治熱渴不止煩悶

生葛汁　竹瀝各二合

和不時服

石蓮散

石蓮心炒黄 浮萍一分 甘草 水一鍾薑少許煎六分徐徐服

治消渴

狗膽入猪膽內陰乾候堪丸丸如桐子麝香湯下二丸兒半丸黄狗膽

茅先生龍涎膏

陰杦下大螺去殼爛研入畫粉如螺大腦少許滴水丸桐子大懸當風久愈妙枇杷葉炙去毛濃煎

湯呑十丸十四丸

胡黃連散治諸渴及瘖渴解諸熱

胡黃連　麥門冬　乾葛　玄參

甘草炙　枇杷葉炙去毛

等分末一錢水七分薑一片煎五分入蜜三五滴

煎四分溫服

嬰孺麥門冬湯治夏天服藥大下後胃中虛熱渴

麥門冬　甘草　龍骨各四分　枳實炙

黃芩　茯苓　人參各三分

水四升煮升半分三服不差水芹煮濃汁啜服

又

冬瓜炮絞汁服

嬰孺苦蔞湯治熱渴或吐下後虛熱渴

苦蔞五分　黃芩三分　知母　蘆根各二分

生米二合　麥門冬生三分

切水五升煮二升如飲漿度服

寶鑑治渴腹急身熱浮水散

蝸牛二七個甘草水洗　草龍膽一兩蝸牛作餅陰乾

末服一捻許浮水與飲只一服效

莊氏兒因疾致渴不免與飲須入烏梅陳小麥煎水

多飲無害從小便出不入大腸

孔氏消渴

熟瓜去青水調瓜瓤飲

吉氏治虛渴調中散

人參　白术各半錢　肉桂　犀角

藿香　甘草炙各一錢

末半錢棗湯調下

治渴螽唇瑞蓮膏

旱蓮心　浮石　乾葛　海螵蛸

蒲黄

等分末蜜爲膏旋丸如菉豆枇杷葉湯下兒小螽

唇上

聖惠灸陽剛二穴各一壯在第十椎下兩傍各三寸

陷者中炷如麥

黄疸第八

巢氏黄疸之病由脾胃氣實而外温氣乘之變生熱

脾與胃合肌肉俱象土色黄胃爲水穀之海熱搏水穀氣蘊積成黄蒸發于外身疼髆背強大小便澀皮膚面目齒爪皆黄小便如屋塵色看物皆黄是也便利者不渴者易治渴心腹滿小便澀難治脉沉細而腹滿者死

兒在胎母藏氣熏蒸于胎至生體皆黄爲胎疸勿灸

錢乙論身皮目皆黄者黄病也身體痛背強大小便澀身面目爪皆黄小便如屋塵色看物皆黄渴者難治此黄疸也二證多得于大病後別有不因病後身

微黃者胃熱也大人亦同又面黃腹大食土渴者脾疳也又自生而身黃者胎疸也古書云諸疸皆熱深黃者若是淡黃兼白者胃怯胃不和也

千金翼秦王九疸散

胃疸食多喜飲梔子仁主之

心疸煩心心中熱茜根主之

腎疸唇乾葶藶子主之熬

脾疸尿赤少惕惕恐苦蔞主之

膏疸飲少尿多秦椒瓜蒂主之椒汁膏一作肺

舌疸渴而數便鍾乳主之

肉疸小便白凝水石主之

髓疸目深多嗜卧牡蠣澤瀉主之

肝疸胃熱飲多水激肝白术主之

隨病加半篩散飲服五分七日三加至方寸匕兒量與

茅先生

瓜蒂半兩 丁香二錢

末搐鼻中黃水從鼻出後用天竺黃散實熱門

治二十四般瘴毒

屋下乘漏泥　　　寵心土　　白鱔土

寒水石

等分末雞子清調塗便沒先用實積牛黃丸通下

實熱門後補常服天竺黃散

張煥治疸雙連丹

川黃連　　胡黃連各一兩

羅末黃瓜一枚去瓤留蓋入藥末蓋定麪裹慢火

燒焦去麪擣爲丸菉豆大服七至十粒温水下量

加減

吉氏

茵陳二分　大黃　秦艽各三分　山梔

郁李仁　朴硝各四分

末蜜丸桐子大湯化下

黑疸第九

千金翼治黃疸變黑疸

土瓜根擣汁一升頓服病從小便出兒減

又

當歸三兩　桂心六兩　乾棗十七枚　麥門冬一升
大黃一兩　茵陳　黃芩　黃耆一本無
乾薑　茯苓　芍藥　黃連
石膏　人參　甘草炙各二兩
㕮咀水一斗煑三升半分四服兒減
治黑疸身皮大便皆黑亦主一切黃赤茯苓散
赤小豆卅粒　茯苓　女萎各六銖　雄黃一銖
瓜丁四銖　甘草炙二銖
水三升煮豆茯苓取八合擣四味爲散和半錢七

服須臾吐愈兒半之

幼幼新書卷第二十　城西草堂刊

章美之刊